

Fig 1. Nos préconisations 2018 pour la région

Ce tableau présente les préconisations variétales en fonction de la précocité et des zones de production.

Besoins en température du semis à 32% d'humidité (estimatif)	Variétés confirmées depuis plusieurs années	Variétés nouvelles à essayer sur de petites surfaces	TARDIVES	1	2	3	4	5	6	
>2040°	CAPUZI DKC6050	IRRIDEOS								
2000° à 2040°	DKC5685 DKC5830 FURTADO P0837 P0937 SY SANDRO									
1950° à 2000°	ANAKIN DKC5182 DKC5632 DKC5741 P0725	BERLIOZ DKC5404 KWS SELECTO RGT MEXXPLEDE								
1920° à 1940°	DKC4814 DKC5031 EPIKUR LBS4378 URBANIX P0312	KWS INTELIGENS								
1900° à 1920°	DKC4751 DKC5065 KERALA TEXERO P9903									
1880 à 1900°	DKC4162 DKC4670	DKC4598								
1820° à 1880°	DKC4178 ES GALLERY ES FARADAY P9234 SY ENERMAX	ES WINVAY EXENTRIK								
1760° à 1800°		KWS ANTONIO								
1750°	DKC388 VOLNEY	LG31272 SY BOOST								
1725°	ES INVENTIVE ES RUNWAY KWS JAIPUR MAGENTO	KWS NOSTRO								
1670°	CROSSBEY DENTRICO ES PERSPECTIVE KOLOSSALIS SY CALO	DAMARIO KWS GUSTAVIUS RGT BERNAXX RGT SYNFORNIX SY BRENTON		PRÉCOCES						

Se limiter à 60 % des surfaces pour ce type de variétés « tardives » pour le secteur.

1. Vallée du Rhône. 2. Plaine du Rhône - Plaine de l'Ain - Bas Bugey. 3. Bresse - Dombes - Côteière de Dombes - Marais de Bourgoin - Combes de Savoie - Hardt - Plaine du Rhin - Finage - Plaine de Chemin. 4. Bordure du Sundgau - Ried - Kochersberg - Terres Froides - Plateau de Chambaran - Plaine de Bièvre - Vallée de l'Ognon. 5. Sundgau - Pays de Hanau - Outre forêt - Nord de la Haute-Saône. 6. Jura Alsacien - Alsace bossue - Lorraine tardive - Haut Doubs - Monts du Lyonnais