

Céréales					
Hiver					
Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Sorgo	Triticale
					Epeautre
Spécialités commerciales		Doses autorisées kg/ha ou l/ha ou g m.a./ha	Racinaire et foliaire	HRA C	Foliaire
				HRA C	Restrictions sols drainés
					DAR (jour ou stade) ou stade max d'application
					Galliet
					Chardon
					Lisersons
					Rumex de souche
					Renouée liseron
					Renouée oiseaux

							Accurate TF / Racing TF / Daytona TF	0,06 - 0,075	metsulfuron 7 % thifensulfuron 68 %	2 2		-	BBCB 39 (DFE)						
							AKA/Sekens (1)	1	florasalame 2,5	2	furoxypyr 100 + clopyralid 80	4	-	BBCB 37 (DFP)					
							Allie Duo SX / Presite SX	0,075	metsulfuron-méthyl 6,7 % thifensulfuron-méthyl 33,3 %	2 2		oui (8)	BBCB 39 (DFE)						
							Allie Max SX/ Pointer Ultra SX	0,035	metsulfuron-méthyl 14,3 % tribénuron-méthyl 14,3%	2 2		oui (>45% argile)	BBCB 39 (DFE)						
							Allie Star SX/ Biplay SX	0,045	metsulfuron-méthyl 11,1% tribénuron-méthyl 22,2%	2 2		oui (>45% argile)	BBCB 39 (DFE)						
							Biathlon	0,07	tritofosfuron 71,4%,	2		-	56 j						
							Boudha	0,02	metsulfuron-méthyl 25% tribénuron-méthyl 25%	2 2		oui (>45% argile)	BBCB 39 (DFE)						
							Canopia*	0,07	tritofosfuron 71.4 % florasalame 5.4 %	2 2		-	BBCB 39 (DFE)						
							Croupier OD	0,6	metsulfuron 9	2	furoxypyr 225	4	oui (>45% argile)	BBCB 39 (DFE)					
							CharDEX/Effigo (2)	1,5			MCPA 350+clopyralid 35	4	-	BBCB 39 (DFE)					
							Florasalame (3)		florasalame 50	2		-	BBCB 39 (DFE)						
							Furoxypyr (3)	200			furoxypyr 200	4	-	BBCB 39 (DFE)					
							Harmony Extra SX / Pragma SX	0,075	thifensulfuron-méthyl 33,3 % tribénuron-méthyl 16,7 %	2 2		oui (8)	BBCB 39 (DFE)						
							Harmony M SX / Concert SX	0,15	metsulfuron 4 % thifensulfuron 40 %	2 2		oui (9)	BBCB 39 (DFE)						
							Metsulfuron (6)	0,025 - 0,03	metsulfuron-méthyl 20%	2		oui (> 45 % argile)	BBCB 39 (DFE)						
							Metiss	2			MCPA 400	4	-	BBCB 39 (DFE)					
							Omnera LQM / Prova- lia LQM (7)	1	metsulfuron 5 thifensulfuron 30	2 2	furoxypyr 135	4	-	BBCB 39 (DFE)					
							Phyton/ Kumys	0,1	metsulfuron 4 % +bensulfuron 50 %	2 2		oui	BBCB 39 (DFE)						
							Picaro SX	0,06	thifensulfuron-méthyl 25 % tribénuron-méthyl 25 %	2 2		-	BBCB 39 (DFE)						
							Pixxaro EC / Frimax (5)	0,25-0,5			halauxifen 12.5 furoxypyr 280 cloquintocet 12	4 4	-	BBCB 30- 39 (EIC-DFE)					
							Prima STAR / Turban	0,03	tribénuron-méthyl 75 %	2		-	BBCB 39 (DFE)						
							Starane Gold (4)	1,5	florasalame 1	2	furoxypyr 100	4	-	BBCB32-45 (2N-Gonflemtent)					
							Synopsis	0,05	metsulfuron-méthyl 8,3 % tribénuron-méthyl 8,3% florasalame 10,5 %	2 2 2		oui (>45% argile)	BBCB 39 (DFE)						
							Zypar / Renitar (5)	0,5-1			halauxifen 6 florasalame 5 cloquintocet 6	4 4	-	BBCB 30-45 (EIC-Gonfle- ment)					

■ Sensible ■ Mouvement sensible ■ Faible à régulier ■ Inefficace

(1) Sur cultures de printemps, limitation à 2 nœud à 1,5 l/ha. Sur céréales d'hiver, 0,75 l/ha après stade 2 nœuds.

(2) 2 nœuds pour les cultures de printemps.

[3] Vérifier les homologations : variations possibles de stades limites selon les cultures en fonction des spécialités.

(4) Utilisation possible jusqu'au stade gonflement (BBCH45) sur blé tendre, blé dur d'hiver, épeautre, triticales et orge d'hiver - 2 nœuds pour les autres cultures.

(15) L'utilisation sur avoine d'hiver est possible, mais uniquement jusqu'au stade épi 1 cm, à la dose de 0,25 l/ha pour Pixxaro EC et 0,5 l/ha pour Zypar.

(6) Doses et homologations par culture pouvant varier d'une spécialité à une autre - notamment pour l'avoine.

[7] Sur avoine d'hiver, dose de 0,75 l/ha recommandée.

(8) Ne pas appliquer sur parcelles drainées, uniquement pour applications précoces (avant BBCH20)

(9) Ne pas appliquer sur parcelles drainées, en période de drainage.

* fin des utilisations au 07/01/2025